

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

HOTARARE  
Nr. 20 din 02.03.2007  
privind aprobarea Planului de masuri  
pentru prevenirea si combaterea gripei aviare la nivel local

Consiliul local al comunei Ghindaoani, judetul Neamt ;

Avand in vedere prevederile art. 38 alin. 6) din legea administratiei publice locale nr. 215/2001 ; avand in vedere prevederile Ordinului nr. 87/2006 al A.N.S.V.S.A. pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea și combaterea influenței aviare ; avand in vedere Ordinul nr. 26 / 2005 al A.N.S.V.S.A. pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru prevenirea și combaterea bolilor infectocontagioase și parazitare la animale ;

Vazand referatul primarului comunei Ghindaoani , inregistrat sub nr.1414 / 20.02.2007.

Luand act de avizul comisiilor de specialitate ;

In temeiul art. 46 din legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

HOTARASTE :


Art. 1 –Se aproba Planul de masuri pentru prevenirea si combaterea gripei aviare la nivel local , conform anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 –Secretarul comunei Ghindaoani va comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA



Contrasemneaza pentru legalitate  
SECRETAR  
ARISTIDE MIRON



**Plan de masuri  
pentru prevenirea si combaterea gripei aviare la nivel local**

I. Masuri de profilaxie contra gripei aviare

- Declararea tuturor efectivelor de pasari existente in gospodarii.
- Informarea medicului veterinar despre toate cazurile de imbolnavire sau moarte la animale si pasari.
- Izolarea pasarilor in curti sau adaposturi.
- Interzicerea accesului ratelor si gastelor la luciul de apa ;
- Interzicerea imprastierii gunoiului de grajd in afara curtilor (acesta se va distruge prin ardere in incinta fiecarei gospodarii)
- Interzicerea miscarii in afara judetului a tuturor categoriilor de pasari si porci.
- Interzicerea oricarei aglomerari de animale din specia pasari , porcine (piete, oboare).
- Informarea locuitorilor despre aceasta boala prin intermediul cabinetelor umane , veterinare , scolilor , bisericilor , mass-media.
- Supravegherea efectivelor de pasari domestice prin examene clinice , anatomopatologice si virusologice.
- Monitorizarea pasarilor migratoare din zona.
- Asigurarea aprovizionarii cu dezinfectante si echipamente de protectie omologate conform OMS pentru intreg personalul care ar putea fi implicat intru-un episod de gripa .
- Folosirea dezinfectoarelor la intrarea/iesirea institutiilor publice (primarie, biserici, scoli, spatii comerciale , dispensare) si la intrare/iesirea din comuna.
- Colectare si ecarisarea cadavrelor se va face prin respectarea masurilor de prevenire a contaminarii.
- Pe perioada de carantina se interzice vanzarea in piete , targuri a pasarilor si oualor
- Se va evita contactul oamenilor cu palmipede (rate , gaste , etc) deoarece sunt rezervoare a virusului in caile respiratorii , in tubul digestiv , mai ales in cloaca.
- Ratele nu vor fi acceptate ca pasari de agrement si nu vor fi lasate sa patrunda in locuinta.

- In zona de protectie pe o raza de cel putin 3 km , se vor asigura supravegherea si mentinerea sanatatii efectivelor de pasari din gospodariile populatiei prin *depistari periodice*, unde este inclusa si o zona de supraveghere cu raza de cel putin 10 km.
- Periodic , la intervale de cel mult o saptamana din gospodariile populatiei se vor trimite probe de laborator pentru supraveghere sanitara veterinara.

## II. Masuri de combatere a bolii

Dupa confirmarea oficiala a diagnosticului de Gripa aviara , se vor lua urmatoarele masuri:

- toate pasarile din localitatea respective se ucid pe loc fara intarziere , toate pasarile care au murit sau au fost ucise , precum si toate ouale se distrug , aceste operatii se vor efectua in asa fel incat sa reduca riscul raspandirii bolii .

- orice material sau deseu-furajere, asternutul sau gunoiul de grajd – susceptibil de a fi contaminat vor fi distruse sau tratate conform cu instructiunile medicului veterinar oficial .

- atunci cand pasarile domestice dintr-o curte au fost taiate in cursul perioadei probabile de incubatie a bolii , carnea provenita de la aceste pasari va fi oriunde este posibil identificata si distrusa.

- dupa efectuarea operatiunilor prezentate , spatiile folosite pentru cazarea pasarilor , imprejmuirile lor , vehiculele utilizate pentru transport si toate echipamentele posibil a fi contaminate vor fi curatite si dezinfectate in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare.

- operatiunile de curatire si dezinfectie se vor efectua cu supravegherea medicului veterinar oficial in conformitate cu instructiunile medicului veterinar de stat si reglementarilor in vigoare .

- dezinfectantele care se vor utilize si concentratiile lor sunt cele aprobate de catre autoritatea sanitara veterinara teritoriala . Procedura pentru curatirea si dezinfectia primara a gospodariilor infectate consta in:

- aspersarea incintelor in care pasarile au fost cazate si orice parte a celorlalte cladiri, terenuri, etc. contaminate in cursul uciderii sau a examenelor postmortem, cu dezinfectantele aprobate de legislatia sanitara veterinara in vigoare.

- colectarea si distrugerea impreuna cu carcasele a tuturor resturilor de pasari sau de oua , care ar putea contamina cladirile, terenurile, instrumentele.

- mentinerea dezinfectantului folosit cel putin 24 de ore , pe suprafetele mentionate mai sus .

Procedura pentru curatirea si dezinfectia finala a gospodariei infectate consta in:

-indepartarea resturilor de pe toate suprafetele prin aplicarea unui agent de degresare urmata apoi de spalare cu apa.

-aplicarea dezinfectantului dupa curatire si spalare si mentinerea acestuia timp de 7 zile.

-repetarea aplicarii unui agent degresant ,clatirea cu apa rece , aspersarea cu dezinfectant si spalarea din nou cu apa.

-prelucrarea asternutului folosit si a gunoiului de grajd prin ardere care sa permita distrugerea virusului.

-nici o pasare nu va fi reintrodusa in gospodarie decat la cel putin 21 de zile dupa terminarea operatiunilor de dezinfectie .

-activitatea de depistare va continua pana la ridicarea masurilor de carantina.

Tratamentul termic al carnii si oualor exclude posibilitatea infectarii omului pe aceasta cale , iar spalarea cu apa calda si sapun a mainilor si in general a suprafetelor contaminate , ca si utilizarea de antiseptice si dezinfectante uzuale , asigura distrugerea virusului gripal in curs de cateva minute.

### III. Masuri concrete de prevenire si combatere a gripei aviare

- 1) –educarea populatiei prin adunari populare , discutii restranse cu cetatenii pe zone ale comunei , prezentarea unor masuri in randul elevilor si al copiilor , discutii ale preotilor cu enoriasii pe aceasta tema ;
- 2) – mentinerea pasarilor in spatii inchise in fiecare gospodarie ;
- 3) –depozitarea gunoiului de la pasari in platforme din incinta fiecarei gospodarii ;
- 4) –semnalarea de catre cetateni prin adresarea catre autoritatile locale si specialistii veterinari a tuturor pasarilor moarte semnalate in zona intravilana si extravilana a comunei ;
- 5) –monitorizarea starii de sanatate a populatiei cat si a pasarilor din gospodariile cetatenilor – depistarea cazurilor de imbolnavire in randul populatiei precum si al pasarilor .
- 6) – reactivarea comandamentului antiepizootic local ;
- 7) – asigurarea aprovizionarii cu dezinfectante si echipamente de protectie omologate O.M.S. pentru intreg personalul care ar putea fi implicat intr-un episod de gripa aviara .